

各地で注意報発令！ 果樹カメムシ類は 早めの防除を！



【ももへの加害】

幼果期に被害を受けると吸汁部からヤニを出す。
実への加害は、果実にダメージを与える。

幅広い果樹作物に被害をもたらすカメムシ類が、全国的に多くなることが予想されており、西日本を中心とする多くの県から注意報が発出されています。

2026年6月10日時点の情報／農林水産省「令和8年度病害虫発生予報第3号」より

今後も気温が高く推移すると予想されていることから、越冬世代の活動の活発化に加え、新世代成虫の発生にも注意する必要があります。都道府県の発表する発生予察情報等を参考にしつつ、園内の観察をきめ細かく行い、飛来が認められた場合は、飛来初期から防除を実施しましょう！

代表的な果樹カメムシ類



チャバネアオカメムシ



クサギカメムシ



ツヤアオカメムシ

チャバネアオカメムシの生活環



4月～6月

うめ、さくら、桑、ももなど
数多くの植物をやり渡し加害する

7月以降

すぎ、ひのきの球果を中心に加害するが、
餌が不足すると果樹園に飛来し、
なし、かき、ぶどう、かんきつなどを加害する

第1世代

(第2世代)

第1世代成虫の羽化が早い年は、第2世代成虫が出現します。
夏期にすぎ、ひのきの球果が多いと8月以降に第2世代が増加する傾向があります。



NICHINO

日本農薬株式会社

果樹カメムシ類 防除おすすめ薬剤

■適用病害虫および使用方法（抜粋）

	薬剤名	適用病害虫名	希釈倍数	使用流量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	【有効成分】を含む 農薬の総使用回数 ※[]内は殺虫剤分類	農林水産省 登録番号	
かんきつ	日農 アグロスリン水和剤	アケビコノハ、ヒメエグリバ、アブラムシ類 カメムシ類、アザミウマ類、ミカンバエ成虫	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回 以内	散布	【ｼｬ® ﾎﾞﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第16585号	
	日農 アグロスリン乳剤	アザミウマ類、ミカンハモグリガ、アブラムシ類 コアオハナムグリ、ケシキスイ類、カメムシ類	1000～ 2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回 以内	散布	【ｼｬ® ﾎﾞﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第16591号	
	日農 モスピランSL液剤	アブラムシ類、ミカンハモグリガ コアオハナムグリ、ケシキスイ類、アゲハ類 コナジラミ類、アザミウマ類、カイガラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫、カメムシ類、ミカンバエ	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日前 まで	3回 以内	散布	【ｱﾅﾀﾞﾐﾌﾞﾘｯﾄﾞ】3回以内[4A]	第20642号	
		ゴマダラカミキリ	200～ 400倍	30～75ℓ /10a			主幹から 株元に散布			
	モスピラン顆粒水溶剤		アブラムシ類、ミカンハモグリガ、アザミウマ類 カイガラムシ類、ゴマダラカミキリ成虫 コアオハナムグリ、ケシキスイ類、アゲハ類 カメムシ類、ミカンバエ	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日前 まで	3回 以内	散布	【ｱﾅﾀﾞﾐﾌﾞﾘｯﾄﾞ】3回以内[4A]	第22583号
			コナジラミ類	4000倍				主幹から 株元に散布		
ゴマダラカミキリ			200～ 400倍	30～75ℓ /10a						
なし	アーデントフロアブル	アブラムシ類、ハダニ類、カメムシ類 シンクイムシ類、チャノキイロアザミウマ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ﾌﾗｸﾀﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第23266号	
	日農 アーデント水和剤	シンクイムシ類、アブラムシ類 ハダニ類、カメムシ類	1000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回 以内	散布	【ﾌﾗｸﾀﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第18955号	
	日農 アグロスリン水和剤	ナシチビガ、アブラゼミ	1000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ｼｬ® ﾎﾞﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第16585号	
		シンクイムシ類、カメムシ類 アブラムシ類、ハマキムシ類	1000～ 2000倍							
	パーマチオン水和剤		カメムシ類、アブラムシ類 ニセナシサビダニ、シンクイムシ類	1000～ 2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫30日前 まで	5回 以内	散布	【ﾌｧﾝﾌﾟ ﾚｰﾄ】5回以内[3A] 【MEP】6回以内[1B]	第15458号
			ハマキムシ類、ナシゲンバイ ナシホソガ、ナシチビガ	1000倍						
モスピラン顆粒水溶剤		カメムシ類、アブラムシ類、シンクイムシ類 カイガラムシ類、カキノヒメヨコバイ ナシホソガ	2000～ 4000倍 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ｱﾅﾀﾞﾐﾌﾞﾘｯﾄﾞ】3回以内[4A]	第22583号	
りんご	アーデントフロアブル	シンクイムシ類、キンモンホソガ、アブラムシ類 ハダニ類、カメムシ類、オオタバコガ クワコナカイガラムシ、コガネムシ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ﾌﾗｸﾀﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第23266号	
	モスピラン顆粒水溶剤	アブラムシ類、ギンモンハモグリガ キンモンホソガ、シンクイムシ類 カメムシ類、リンゴワタムシ	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ｱﾅﾀﾞﾐﾌﾞﾘｯﾄﾞ】3回以内[4A]	第22583号	
		カイガラムシ類、モモチョッキリゾウムシ コガネムシ類成虫	4000倍							
		ケムシ類、キリガ類	2000倍							
もも	アーデントフロアブル	シンクイムシ類、アブラムシ類、ハダニ類 カメムシ類、アザミウマ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ﾌﾗｸﾀﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第23266号	
	日農 アーデント水和剤	モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類 ハダニ類、カメムシ類、アザミウマ類 ドウガネブイブイ	1000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ﾌﾗｸﾀﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第18955号	
	日農 アグロスリン水和剤	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	5回 以内	散布	【ｼｬ® ﾎﾞﾄﾘﾝ】5回以内[3A]	第16585号	
		モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類 アカエグリバ、アケビコノハ、オオエグリバ ヒメエグリバ、カメムシ類	1000～ 2000倍							
	モスピラン顆粒水溶剤		アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類 アザミウマ類、カメムシ類、コガネムシ類成虫 モモチョッキリゾウムシ コスカシバ、カイガラムシ類、クビアカツヤカミキリ	2000～ 4000倍 2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ｱﾅﾀﾞﾐﾌﾞﾘｯﾄﾞ】3回以内[4A]	第22583号
かき	アーデントフロアブル	カメムシ類、アザミウマ類 ハダニ類、カキノハタムシガ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ﾌﾗｸﾀﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第23266号	
	日農 アーデント水和剤	カメムシ類、アザミウマ類 ハダニ類、カキノハタムシガ	1000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回 以内	散布	【ﾌﾗｸﾀﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第18955号	
	日農 アグロスリン水和剤	カメムシ類、カキノハタムシガ、アザミウマ類	1000～ 2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ｼｬ® ﾎﾞﾄﾘﾝ】3回以内[3A]	第16585号	
	パーマチオン水和剤	カキノハタムシガ、アザミウマ類 ハマキムシ類、カメムシ類	1000～ 2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫30日前 まで	3回 以内	散布	【ﾌｧﾝﾌﾟ ﾚｰﾄ】3回以内[3A] 【MEP】3回以内 (樹幹処理は2回以内)[1B]	第15458号	
		イラガ類、ミノガ類	1000倍							
		コガネムシ類	2000倍							
モスピラン顆粒水溶剤		アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノハタムシガ カキノヒメヨコバイ、カメムシ類	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	【ｱﾅﾀﾞﾐﾌﾞﾘｯﾄﾞ】3回以内[4A]	第22583号	

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。 <記載以外の作物にも登録があります・詳しくは製品ラベルをご確認ください>